

PERIO-AID® PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

БІОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ

захищає ясна від впливу зовнішніх факторів



АКТИВНІ РЕЧОВИНИ

• 0.20% хлоргексидину

Найефективніший антисептик, що вважається **золотим стандартом**, з широким спектром антибактеріальної дії. Основне його призначення – запобігання розвитку бактеріального нальоту.

• 0.20% гіалуронової кислоти

Природний компонент тканин слизової оболонки ротової порожнини. Формує захисний шар, допомагає регенерації пошкоджених тканин та прискорює процес їхнього відновлення.

• 5% пантенолу

Сприяє зменшенню запалення ясен на ураженій ділянці, а також стимулює регенерацію тканин, що допомагає їм відновитися.



DENTAID
technology

hyaluronrepair®

PERIO-AID® PROTECT

був розроблений
з використанням інноваційної
технології DENTAID hyaluronrepair®

DENTAID technology hyaluronrepair®

технологія ДЕНТЕЙД гіалуронріпейр

Клінічно випробувана технологія, що базується на використанні гіалуронової кислоти, яка є природним компонентом тканин слизової оболонки ротової порожнини. Це дозволяє формувати захисний шар, що сприяє швидкій регенерації та відновленню пошкоджених тканин.



PERIO-AID® PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

БІОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ

захищає ясна від впливу зовнішніх факторів



ЗАСТОСУВАННЯ PERIO-AID® PROTECT

- наносити гель розміром з горошину на ясна тричі на день
- після використання **PERIO-AID® PROTECT** не вживати їжу чи напої протягом 30 хвилин
- застосовувати після процедури через _____ годин
- додатково _____

ІНШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- упродовж перших 24 годин після операції робити ванночки з ополіскувачем **PERIO-AID® INTENSIVE CARE** (ПЕРІО-ЕЙД інтенсивний догляд). Засіб потримати у роті зі сторони операційної ділянки протягом 30 секунд, потім дати витекти. **Не полоскати! Не спльовувати!** – це може спричинити кровоточу та/або розходження швів
- протягом наступних 10 - 15 днів або до зняття швів полоскати рот 30 секунд ополіскувачем **PERIO-AID® INTENSIVE CARE**
- після пародонтологічного лікування упродовж 14 днів чистити зуби гелем **PERIO-AID® INTENSIVE CARE** (замість зубної пасті) зранку та ввечері
- після операційну зону 2 тижні чистити надм'якою зубною щіткою **VITIS® SURGICAL** (BITIC хірургічна), а потім до остаточного загоєння – щіткою **VITIS® ULTRASOFT** (BITIC ультрам'яка)

ПРИМІТКИ

- засоби **PERIO-AID®** (ПЕРІО-ЕЙД) містять хлоргексидин, який може спричинити тимчасове забарвлення нальоту на зубах – його легко уникнути за умови щоденного правильного чищення зубів. За потреби лікар-стоматолог допоможе усунути це забарвлення
- інші побічні ефекти (печіння та зміна смакових відчуттів) виникають дуже рідко – детально, будь ласка, читайте в інструкції
- **PERIO-AID® PROTECT** є допоміжним засобом при стоматологічних процедурах



Oral Health Experts